



Mereologie und Topologie als Basis für eine Theorie des räumlichen Schließens

Dr.-Ing. Dirk Müller

Vortrag im Rahmen der AG Softwaretechnik

03.05.2007

Übersicht

- (1) Begriff und Historie
- (2) Abgrenzung zur Mengenlehre, Beispiele
- (3) Axiome und weitere Konzepte
- (4) Erweiterungen, Komposition, Dekomposition
- (5) Mereologie + Topologie = Mereotopologie
- (6) Anwendungen und räumliches Schließen
- (7) Referenzen

Begriff und Historie 1/2

- von *grch.* „μερος“ , „Teil“, konstituierendes Prädikat (in PL1) ist Pxy : „ x ist Teil von y “
- fundamentale mathematisch-philosophische Theorie mit Wurzeln bereits vor der Mengenlehre nach *Cantor* und *Peano*
- ohne Formalismen: *Aristoteles*, *Husserl*
- **1927** *Stanisław Leśniewski* führt Begriff ein, Schule der polnischen Mereologie mit bekanntestem Schüler *Alfred Tarski*

Begriff und Historie 2/2

- 1951 *Nelson Goodman* mit einer formalen Theorie der Teil-Ganzes-Beziehung
- 1970 *Rolf Eberle* klärt die Beziehung zur Mengenlehre; atomfreie Mereologie
- 1991 *D. K. Lewis*: Theorie, in der a zugleich Element und Untermenge von b sein kann
- 1999 *R. Casati & A. Varzi* verheiraten die M. mit der Topologie zur Mereotopologie
- findet trotz **fundamentaler Bed.** bisher kaum Beachtung i. d. akad. Lehre => Veränderg.

Beispiele 1/2

umgangssprachlich weiter Gebrauch:

- Der Henkel ist ein Teil der Tasse.
 - Die Kappe ist ein Teil des Füllers.
 - Die linke Hälfte ist dein Teil des Kuchens.
 - Hessen ist ein Teil von Deutschland.
 - Diese Ecke ist ein Teil des Wohnzimmers.
 - Der elfte Akt war der beste Teil des Stücks.
- (als unstrittige Beispiele)

Beispiele 2/2

auch i.w.S. gebraucht (materiell, konzeptuell):

- Der Marmor ist ein Teil der Statue.
- Gin ist ein Teil von Martini.
- Vorausschauend zu handeln ist Teil davon ein guter Autofahrer zu sein.
- 2 ist ein Teil von 3.
- Die ganzen Zahlen sind Teil der reellen Z.
- Humanität ist ein Teil des Menschseins.

Vergleich zur Mengenlehre

| | <u>Mereologie</u> | <u>Mengenlehre</u> |
|---|-------------------|-------------------------|
| Relation | P_{xy} | $x \in M$ |
| Ebenenwechsel | nein | ja |
| x | konkret/abstr. | konkr./abstr. |
| y bzw. M | konkret/abstr. | abstrakt |
| Ontologie | neutral | Nominalismus |
| Wohlgeformtheit | ja | nein (<i>Russell</i>) |
| => deutet in gewisser Weise Überlegenheit der Mereologie an (<i>Lewis 1991</i>) | | |

Axiome 1/2

- Konsistenz zu geg. Bsp. legt die drei Halbordnungsbedingungen nahe, Theorie M
(P.1) $\forall x: Pxx$ (Reflexivität)
(P.2) $\forall xy:(Pxy \wedge Pyx) \rightarrow x=y$ (Antisymm.)
(P.3) $\forall xyz:(Pxy \wedge Pyz) \rightarrow Pxz$ (Transitivität)
- (P.1) z.T. kein refl. Gebrauch („Leber ist Teil der Leber“?, jedoch später Def. von PP)
- (P.2) „vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra“ (*Borges* 1949), jedoch fiktionaler Text

Axiome 2/2

- (P.3) ist am umstrittensten
 - Soldat ist Teil einer kleinen Einheit, aber **niemals** einer großen
 - Zellkern ist Teil einer Leberzelle, aber **nicht** der Leber
- **Rettung der Transitivität** von P durch Abgrenzung zu „direkter Teil“ bzw. „funkt. Teil“
- **nicht-wohlgeformte Mereologie** ist möglich (Kreise im Rel.-graphen) => mgl. Forschung

Erweiterungen 1/2

- Vereinbarung: keine **Allquantoren** mehr
- M sei Theorie mit Halbordnungs-Bed.: **Basismereologie**
- weitere 2-stellige Prädikate per Definition:

$Oxy := \exists z(Pzx \wedge Pzy)$ (Overlap)

$Uxy := \exists z(Pxz \wedge Pyz)$ (Underlap)

$PPxy := Pxy \wedge \neg Pyx$ (Proper Parthood)

$PExy := \neg Pxy \wedge Pyx$ (Proper Extension)

$OXxy := Oxy \wedge \neg Pxy$ (Over-crossing)





$UXxy := Uxy \wedge \neg Pyx$ (Under-crossing)

$POxy := OXxy \wedge OXyx$ (Proper Overlap)

$PUxy := UXxy \wedge UXyx$ (Proper Underlap)

Erweiterungen 2/2

vier typische Fälle als Schemata in 2D:



Oxy

Pxy

Oxy Pxy

Oxy OXxy

POxy Uxy

Uxy

x=y

Uxy **PPxy** **POxy**

UXxy

UXxy PEyx

PUxy

symm.

nicht symm.


symm. symm.



x



y



z

Dekomposition 1/2

- durch Dekompositionsprinzipien:
(P.4) $PPxy \rightarrow \exists z(Pzy \wedge \neg Ozx)$ (Supplement)
führt auf Minimale Mereologie (MM)
(P.5) $\neg Pyx \rightarrow \exists z(Pzy \wedge \neg Ozx)$ (Starkes S.)
führt auf Extensionale Mereologie (EM)
- (P.4) „Falls ein Objekt ein echtes Teil hat, soll es ein weiteres solches haben.“
- (P.5) analog zum Ex.-Prinzip der Mengenlehre: „Ein Objekt ist vollständig durch Angabe seiner echten Teile def.“

Dekomposition 2/2

- **Atom**: $Ax := \neg \exists y PPyx$ (Abschluss nach unten)
- **Atomfreiheit**: $\neg Ax$ (als die beiden
- **Atomismus**: $\exists y (Ay \wedge Pyx)$ Extreme)
- Bildung neuer Theorien mit Präfix A bzw. \underline{A}
- z.B. AEM führt dazu, dass Extensionalität auf die Atome zurückgeführt wird:
 $x=y \leftrightarrow \forall z (Az \rightarrow (Pzx \leftrightarrow Pzy))$
- auch: Zwischenformen (schwacher Atomismus / schwache Atomfreiheit)

Komposition 1/2


- Abschluss gegenüber Operationen („Hülle“): zuerst nur Ex., erst im extens. Fall neue Op.
- (P.6) $Uxy \rightarrow \exists z \forall w (Owz \leftrightarrow (Owx \vee Owy))$
- (P.7) $Oxy \rightarrow \exists z \forall w (Pwz \leftrightarrow (Pwx \wedge Pwy))$
- kleinster gem. Underlap, größtes gem. Teil
- Präfix C liefert neue Theorien C(M)M, CEM
- viel klarer als **Summe** und **Produkt** in CEM:
(P.6') $Uxy \rightarrow \exists z (z = x + y)$
(P.7') $Oxy \rightarrow \exists z (z = x \times y)$

Komposition 2/2

- Theorem: $CEM=CMM, (P.4) \wedge (P.7) \rightarrow (P.5)$
- Ex. eines Eins- und Nullelements bzgl. P:
 $\exists z \forall x Pxz$, **Universum** (U oder W) in EM
 $\exists z \forall x Pzx$, N, manche postulieren Existenz !
- $(P.8) \exists w \phi w \rightarrow \exists z \forall w (Owz \leftrightarrow \exists v (\phi v \wedge Owv))$
Axiomensystem, unbeschränkte Summe
- liefert Allg. M. (**GM**), Allg. Extens. M. (**GEM**)
- $GM=GCM, GEM=GMM$ wegen
 $(P.8) \rightarrow (P.7) \wedge (P.6)$

Zusammenfassung der Theorie

- logischer Raum aller bisher vorgestellten Theorien in einem Schema
- *Hasse-Diagramm* des Verbandes mit der Relation „basiert auf“ zwischen Theorien (aus *Varzi 2003*)




Isomorphien und Beispiele

- (A)GEM ist isomorph zur auf nicht-leere Teilmengen beschränkten Teilmengenrelation einer geg. Menge, d.h. einer **Booleschen Algebra ohne Nullelement** (*Tarski 1935*)
- auch I. zwischen *Leśniewskis M.*, die nicht auf klass. Logik beruht, und BA (*Clay 1974*)
- *Lewis' T.* => *Peano* und *Zermelo-Fraenkel* als Theoreme, nicht mehr als Axiome (1991)
- AGEM \cong **reg. offene Mengen im eukl. Raum**
- $\forall xAx$ **Nihilismus** mit $Pxy \leftrightarrow x = y$

Mereotopologie


- Versuche durch *Whitehead* 1920, Prädikat „verbunden“ zu def. (Einbettung T. in M.)
 $\psi_{xy} := \exists z(Ozx \wedge Ozy \wedge \forall w(Pwz \rightarrow Owx \vee Owy))$
- scheiterte (siehe Abb. aus *Varzi* 2006), nur notwendig, nicht hinreichend => Erw. zur MT



x y

ψ_{xy}


verbunden



x y

ψ_{xy} wg. $\exists z$ (rechts)


nicht verbunden



x y

Beispiele

- Prädikat „ist verbunden mit“, Bez. Cxy
 - Der Henkel ist mit der Tasse verbunden.
 - Der Tisch berührt die Wand / ist mit der Wand verbunden. (metrisch, sehr kl. Abst.)
- Dimensionalitätsunterschiede
 - C(Colorado, Arizona) (0)
 - C(Frankreich, D'land) (1)
 - C(Berlin, Brandenburg) (1)



Axiome

- unstrittig sind Reflexivität und Symmetrie:
(C.1) Cxx (C.2) $Cxy \rightarrow Cyx$
- Einschluss: $E_{xy} := \forall z(Czx \rightarrow Czy)$
- Versuch einer Integration von P_{xy} und C_{xy}
(C.3) $P_{xy} \rightarrow E_{xy}$ erweist sich als günstig
MT, Minimale Mereotopologie
- (C.4) $E_{xy} \rightarrow P_{xy}$ liefert dann RMT
(Reduktionistische Mereotopologie), $E \equiv P$
- altern.: nur ein tern. P. CP_{xyz} , x und y sind
verb. Teile von z , $P_{xy} := CP_{xxy}$, $C_{xy} := CP_{xyy}$

GEMT


- Selbstverbundenheit (keine unverb. Teile):
 $SCx := \forall yz (\forall w (Owx \leftrightarrow (Owy \vee Owz))) \rightarrow Cyz$
- analog zu *Whitehead* 1920:
 $(C.7_{sc}) \exists z (SCz \wedge Ozx \wedge Ozy \wedge \forall w (Pwz \rightarrow Owx \vee Owy)) \rightarrow Cxy$ (bedingter Right Join)
- $(C.8) z = \Sigma x \phi x \rightarrow \forall y (Cyz \rightarrow \exists x (\phi x \wedge Cyx))$
(Fusion Connection)
- $MT + GEM + (C.4) + (C.7_{sc}) + (C.8) = GEMT$
Allgemeine Extensionale Mereotopologie

Erweiterungen der GEMT

- Nachahmung der Std.-Op. der Punktmengentopologie
 - $ix := \Sigma z \forall y (Czy \rightarrow Oxy)$ (Inneres)
 - $ex := i(\sim x)$ (Äußeres)
 - $cx := \sim(ex)$ (Hülle)
 - $bx := \sim(ix + ex)$ (Rand)
- Axiome der topologischen Hülle, *Kuratowski*
 - (C.9) $Px(cx)$ (Inklusion)
 - (C.10) $c(cx) = cx$ (Idempotenz)
 - (C.11) $c(x + y) = cx + cy$ (Additivität)
- GEMT + (C.10) = KGEMT, randbasierte ST

Diskussion 1/2

- Unterscheidung offene/geschlossene Obj.?
- „randfreie“ Ansätze (*Whitehead* 1929)
(C.5) $\exists x(\text{IPP}xy)$ (Randfreiheit)
punktfreie Geometrie, mikroskopische Plausibilität, Skalenproblem, schwächere Varianten (vgl. Atomarität)
- Untertypen von C (Dim.), aus *Varzi* 2006



Diskussion 2/2

- Probleme bei Prozessen:
 - **Durchschneiden** eines Objekts (neue Oberfläche entsteht etc.)
 - Bohren eines **Lochs** in eine Kugel => Verwandlung in einen Torus
- **Genus** eines Objekts („Anz. der Löcher“) ist in KGEMT definierbar, siehe *Varzi* 2006

Anwendungen und räumliches Schließen

- Lokalisationstheorie: **Rel. L zwischen Obj. und Raum**
- P und C unabh. voneinander, außer falls (C.4) akzept.
- in KGEMT können nur offene mit geschlossenen Obj. extern verbunden sein, sonst nur mit Überlappung
- $L_{xy} \rightarrow L_{yy}$ (bed. Reflexivität), Auszeichnung von Regionen; können nur auf sich selbst lokalisiert sein
- $L_{xy} \rightarrow C_{xy}$ ist plausibel, aber nicht in KGEMT
- in Worten: „Lokalisation ist Verbundenheit einer bestimmten Art“
- GUIs, KI als Anwendungen in der Informatik

Referenzen 1/2

- A. Varzi: „Mereology“ in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003
<http://plato.stanford.edu/entries/mereology>, Download am 24.04.2007
- Wikipedia: „Mereology“, 2007, <http://en.wikipedia.org/wiki/Mereology>,
Download am 24.04.2007
- J. L. Borges: „El Aleph“, Auszug span. mit engl. Übersetzung, 1949,
http://www1.uol.com.br/bienal/24bienal/rot/frag_borg.htm, Download
am 25.04.2007
- S. Leśniewski: „Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der
Mathematik“, in Fundamenta Mathematicae XIV, 1-81, 1929,
<http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm14/fm1411.pdf>, Download am
25.04.2007
- N. Goodman: „The Structure of Appearance“, 1951, Cambridge (MA):
Harvard University Press (3rd ed. Dordrecht: Reidel, 1977)
- R. A. Eberle: „Nominalistic Systems“, 1970, Kluwer

Referenzen 2/2

- R. Casati und A. C. Varzi: „Parts and Places: The Structures of Spatial Representation“, 1999, Cambridge (MA): MIT Press
- A. C. Varzi: „Spatial Reasoning and Ontology: Parts, Wholes, and Locations“, 2006,
http://www.columbia.edu/~av72/papers/Space_2006.pdf, Download am 25.04.2007
- D. K. Lewis: „Parts of Classes“, 1991, Oxford: Blackwell
- A. Tarski: „Zur Grundlegung der Booleschen Algebra. I“, 1935, Fundamenta Mathematicae 24: 177-198
- R. E. Clay: „Relation of Leśniewski's Mereology to Boolean Algebras“, 1977, Journal of Symbolic Logic 39: 638-648
- A. N. Whitehead: „The Concept of Nature“, 1920, Cambridge: Cambridge University Press
- A. N. Whitehead: „Process and Reality“, 1929, New York: Macmillan