

1.1 Potenzreihen

Lemma 1.1.0 (Lemma von Abel) (a_n) reelle Folge, $b > 0$ so dass $(a_n b^n)$ beschränkt, $0 \leq r < b$. Dann konvergiert die Potenzreihe

$$A(x) := \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

absolut für alle $|x| \leq r$.

Beweis : Ist $|a_n b^n| \leq C$ für alle n , so ist

$$C \cdot \sum_{n \geq 0} \left(\frac{r}{b}\right)^n$$

konvergente Majorante für $|x| \leq r$. □

EX:

$$\sum_{n \geq 0} n x^n \text{ konvergiert absolut für } |x| < 1.$$

Für $0 < b < 1$ ist $b = \frac{1}{1+\delta}$, $\delta > 0$, also $n b^n = \frac{n}{(1+\delta)^n} \leq \frac{n}{1+n\delta} < \frac{1}{\delta}$.

Bekanntlich gibt es zu jeder Menge X eine Menge Y , so dass $Y \not\subseteq X$. Deshalb gibt es Mengen $+\infty$ und $-\infty$ ⁷, so dass $\pm\infty \notin \mathbb{R}$, $+\infty \neq -\infty$. Durch

$$-\infty < x < +\infty, \quad x \in \mathbb{R}$$

wird die Ordnung von \mathbb{R} auf ${}^{\natural}\mathbb{R} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ fortgesetzt. Für eine Potenzreihe $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ sei

$$K_A := \{b \geq 0 \mid (a_n b^n) \text{ beschränkt}\}$$

und

$$R_A := \begin{cases} +\infty & K_A \text{ unbeschränkt} \\ \sup K_A & K_A \text{ beschränkt} \end{cases}$$

R_A ist der sogenannte Konvergenzradius in A .

Satz 1.1.1


(1)

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n \text{ konvergiert absolut für } |x| < R_A$$

⁷plus bzw. minus unendlich

(2)

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n \text{ divergiert f\u00fcr } |x| > R_A$$



EX:

[1]

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} \text{ hat den Konvergenzradius } 1.$$

$$|x| < 1 : \sum_{n \geq 1} \left| \frac{x^n}{n} \right| \leq \sum_{n \geq 0} |x|^n \text{ konvergente Majorante, d.h. } R_A \geq 1.$$

$$x = 1 : \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{ divergiert, d.h. } R_A \leq 1.$$

$$x = -1 : \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \text{ konvergent.}$$

Folgerung: Auf dem Rand $|x| = R_A$ des „Konvergenzkreises“ K_A kann sowohl Konvergenz als auch Divergenz vorliegen.

[2]

$$\sum_{n \geq 0} n! x^n \text{ hat den Konvergenzradius } 0.$$

W\u00e4re n\u00e4mlich $R_A > 0$ so existiert $0 < b, c$ so dass $n! b^n \leq c$ f\u00fcr alle $n \in \mathbb{N}$ also f\u00fcr $n \gg 0$:

$$\frac{n}{e} < \frac{n}{e} \cdot \sqrt[n]{e} < \sqrt[n]{n!} \leq \frac{1}{b} \cdot \sqrt[n]{c} \leq \frac{2}{b},$$

ein Widerspruch.

Die Partialsummen $A_n(x)$ einer Potenzreihe

8/12/99

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

sind Polynome vom Grade $\leq n$,

$$A_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Ist

$$p(x) = \sum_{k=0}^n p_k x^k$$

ein Polynom und $\#NST(p) > n$ so verschwinden alle Koeffizienten $p_k = 0$. Bei Potenzreihen verhält es sich genau so.

Satz 1.1.2 (Identitätssatz) $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ Potenzreihe mit $R_A > 0$, $0 < r < R_A$ so dass $A(x) = 0$ für $|x| \leq r$. Dann ist $a_n = 0$ für alle n .

Folgerung 1.1.3

äq

$$(i) \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{n \geq 0} b_n x^n, |x| \leq r$$

$$(ii) a_n = b_n \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Beweis : Angenommen $\{n \mid a_n \neq 0\} \neq \emptyset$. Dann existiert $m := \min\{n \mid a_n \neq 0\}$,

$$A(x) = x^m \cdot \sum_{k \geq 0} a_{m+k} x^k,$$

insbesondere

$$\sum_{k \geq 0} a_{m+k} x^k = 0 \text{ für } 0 < |x| \leq r,$$

also

$$0 = \left| \sum_{k \geq 0} a_{m+k} x^k \right| \geq \left| |a_m| - \left| \sum_{k \geq 0} a_{m+k} x^k \right| \right|$$

und damit für $0 < |x| \leq r$

$$|a_m| = \left| \sum_{k \geq 1} a_{m+k} x^k \right| = |x| \left| \sum_{k \geq 1} a_{m+k} x^{k-1} \right| \leq |x| \cdot \text{const},$$

folglich $a_m = 0$. □

Satz 1.1.4

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n.$$

Dann hat die Potenzreihe

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n, \quad c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

den Konvergenzradius $R_C \geq \min\{R_A, R_B\}$ und es gilt für alle $|x| < \min\{R_A, R_B\}$

$$C(x) = A(x) \cdot B(x).$$

EX:

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad B(x) = 1 - x, \quad C(x) = 1$$

$$R_C = +\infty > \min\{R_A, R_B\} = 1.$$

[HS] $\sum_{n \geq 0} u_n, \sum_{n \geq 0} v_n$ absolut konvergent,

$$w_n := \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}.$$

Dann ist auch $\sum_{n \geq 0} w_n$ absolut konvergent und es ist

$$\sum_{n \geq 0} w_n = \left(\sum_{n \geq 0} u_n \right) \left(\sum_{n \geq 0} v_n \right) \text{ (Allgemeines Distributivgesetz).}$$

Beweis : Es existiert ein $c \geq 0$ so dass

$$\sum_{n \geq 0} |u_n|, \sum_{n \geq 0} |v_n| \leq c.$$

Dann ist für $m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^m |w_k| = \sum_{i+j \leq m} |u_i| |v_j| \leq \left(\sum_{i \leq m} |u_i| \right) \left(\sum_{j \leq m} |v_j| \right) \leq c^2,$$

d.h. $\sum_{n \geq 0} w_k$ konvergiert absolut.

Sei $s_n := \sum_{k=0}^n u_k, t_n := \sum_{k=0}^n v_k, s = \lim s_n, t = \lim t_n$.

Zu $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ so dass

$$\sum_{k \geq N} |u_k|, \sum_{k \geq N} |v_k| < \frac{\varepsilon}{2 \cdot c + 1}.$$

Für $m > 2N$ ist dann

$$\begin{aligned}
 \left| s_m t_m - \sum_{k=0}^m w_k \right| &= \left| \sum_{i,j \leq m} u_i v_j - \sum_{i+j \leq m} u_i v_j \right| \\
 &\leq \sum_{\substack{i,j \leq m \\ i+j > m}} |u_i| |v_j| \\
 &\leq \sum_{\substack{i \leq m \\ j > N}} |u_i| |v_j| + \sum_{\substack{j \leq m \\ i > N}} |u_i| |v_j| \\
 &\leq c \cdot \sum_{j > N} |v_j| + c \cdot \sum_{i > N} |u_i|.
 \end{aligned}$$

In der Grenze ist damit

$$\left| s \cdot t - \sum_{k \geq 0} w_k \right| \leq \frac{c\varepsilon}{2c+1} < \varepsilon,$$

d.h.

$$s \cdot t = \sum_{k \geq 0} w_k.$$

□

Bemerkung 1.1.5 (Ergänzung (nicht Teil der Vorlesung))

$(a_n)_{n \geq 0}$ beschränkte Folge reeller Zahlen

$$\overline{a_n} := \sup\{a_k | k \geq n\} = \sup_{k \geq n} a_k$$

$$\underline{a_n} := \inf\{a_k | k \geq n\} = \inf_{k \geq n} a_k.$$

Offenbar gilt

$$(1) \quad \underline{a_n} \leq a_n \leq \overline{a_n}$$

$$(2) \quad \underline{a_n} \nearrow, \overline{a_n} \searrow.$$

Da (a_n) beschränkt ist, existieren die Limiten $\lim \underline{a_n}$ bzw. $\lim \overline{a_n}$ und es gilt

$$\overline{\lim} a_n := \lim \overline{a_n} = \inf_n \sup_{k \geq n} a_k \quad (\text{limes superior})$$

$$\underline{\lim} a_n := \lim \underline{a_n} = \sup_n \inf_{k \geq n} a_k \quad (\text{limes inferior})$$

⑤ $(a_n)_{n \geq 0}$ beschränkte Folge reeller Zahlen

äq

(i) (a_n) konvergent

(ii) $\overline{\lim} a_n = \underline{\lim} a_n$.

Folgerung 1.1.6 Konvergiert (a_n) so ist $\lim a_n = \overline{\lim} a_n = \underline{\lim} a_n$.

Beweis : (ii) \Rightarrow (i) : $\underline{a}_n \leq a_n \leq \overline{a}_n$.

(i) \Rightarrow (ii) : $\underline{\lim} a_n \leq \lim a_n \leq \overline{\lim} a_n$. $a := \lim a_n$, $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein $N \geq 0$ so dass $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$ für alle $n \geq N$, also

$a - \varepsilon \leq \underline{a}_n \leq \overline{a}_n \leq a + \varepsilon$ für alle $n \geq N$ für alle $n \geq N$. Damit ist

$a - \varepsilon \leq \underline{\lim} a_n \leq \overline{\lim} a_n \leq a + \varepsilon$, d.h. $\underline{\lim} a_n = \overline{\lim} a_n = \lim a_n$. □

Theorem 1.1.7 (Hadamard) $\Delta(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ so dass $(\sqrt[n]{|a_n|})$

beschränkt. Dann ist

$$R_A = \begin{cases} \infty & \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 0 \\ \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}} & \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0. \end{cases}$$

EX: $A(x) = \sum_{n \geq 0} (1 + (-1)^n) n \cdot x^n$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} 0 & n \equiv 1(2) \\ \sqrt[n]{2n} & n \equiv 0(2) \end{cases}$$

$\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, d.h. $R_A = 1$.

Beweis : Da $(\sqrt[n]{|a_n|})$ beschränkt, ist $R_A > 0$. Zu $0 < t < R_A$ gibt es dann ein $c > 0$ so dass $|a_n t^n| \leq c$, d.h. $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{\sqrt[n]{c}}{t}$ und damit $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{t}$.

Ist $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0$, so ist $\frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}} \geq t$, d.h. $\frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}} \geq R_A$, insbesondere $R_A \neq \infty$. Ist $0 < t < \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$, so ist

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{|a_k|} \leq \frac{1}{t}$$

für alle $n \geq N$, N geeignet und damit $(a_n t^n)$ beschränkt, d.h.

$R_A \geq \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$. Ist $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ und $1 > \varepsilon > 0$ so ist $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \varepsilon$ für alle

$n \geq N$, N geeignet, d.h. $(a_n \varepsilon^{-n})$ beschränkt und damit $R_A = \infty$. □