

Übungen zur Algebra I, SS 2002

Abgabe am Dienstag, den 11.06.2002 vor der Vorlesung

Aufgabe 25. (Einheitengruppe von \mathbb{Z} , Eulersche φ -Funktion)

Für eine natürliche Zahl n definieren wir $\varphi(n)$ als die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen kleiner als n . Die Funktion $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ nennt man *Eulersche φ -Funktion*.

a) Zeigen Sie, dass gilt: $\mathbb{Z}_n^* = \{ m + n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(m, n) = 1 \}$
und folgern Sie: $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$.

b) Zeigen Sie, dass für teilerfremde natürliche Zahlen m und n gilt:

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n) .$$

(Hinweis: Nutzen Sie den bekannten Isomorphismus $\mathbb{Z}_{m \cdot n} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.)

c) Sei $p_1^{n_1} \cdot \dots \cdot p_r^{n_r}$ die Primfaktorzerlegung von n ($p_i \neq p_j$ für $i \neq j$). Zeigen Sie:

$$\varphi(n) = p_1^{n_1-1} \cdot \dots \cdot p_r^{n_r-1} \cdot (p_1 - 1) \cdot \dots \cdot (p_r - 1) .$$

(Hinweis: Beweisen Sie die Aussage zunächst für $n = p_1^{n_1}$ mit nur einer Primzahl p_1 .)

Aufgabe 26. (Chinesischer Restsatz)

Lösen Sie die folgenden simultanen Kongruenzen:

a)

$$\begin{aligned} x &\equiv 14 \pmod{3} , \\ x &\equiv 4 \pmod{10} . \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y &\equiv 2 \pmod{3} , \\ y &\equiv 4 \pmod{8} , \\ y &\equiv 6 \pmod{11} , \\ y &\equiv 8 \pmod{35} . \end{aligned}$$

Aufgabe 27. (Ideale und Homomorphismen)

Seien R und S Ringe, I ein Ideal in R und $f : R \rightarrow S$ ein surjektiver Ringhomomorphismus.

a) Es sei $M_1 := \{ \text{Ideale } I \text{ in } R \text{ mit } \text{kern } f \subset I \}$ und $M_2 := \{ \text{Ideale in } S \}$.

Geben Sie eine bijektive Abbildung zwischen M_1 und M_2 an, und folgern Sie, dass die Ideale in R/I 1:1 korrespondieren zu den Idealen J in R mit $I \subset J$.

b) Seien nun $P \subset R$, $Q \subset S$ Primideale mit $\text{kern } f \subset P$ und $M \subset R$, $N \subset S$ maximale Ideale mit $\text{kern } f \subset M$. Welche Eigenschaften (Primideale, maximales Ideal) besitzen $f(P)$ und $f(M)$ beziehungsweise $f^{-1}(Q)$ und $f^{-1}(N)$?